正規分布と関連する分布

- 自然界や一般に観察できる多くのものの分布は、平均値を中心に左右対称の釣鐘状の分布になっていることがある
 - 生物現象、毎年の雨量など
 - 身長や体重、標準的なテストの成績など

正規分布 (normal distribution)

正規分布とは

- 平均値を中心に左右対称の釣鐘状になる分布を、「正規分布」という

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- μ : 平均値
 - σ : 標準偏差
 - σ^2 : 分散
- 確率密度関数が上の式になるとき、「 $\mathcal{X}$ は、平均が μ で標準偏差が σ の正規分布にしたがう」といい、 $N(\mu, \sigma^2)$ と表す
 - つまり、平均値と分散 (標準偏差) から分布が決まる
 - さまざまな推定や検定に使われる

正規分布の特徴

- 分布の中心は平均値 μ で、最も高い値 (極大値) をとる
 - 平均値が変化すると、分布が左右に移動する
- $\mu \pm \sigma$ で変曲点 (曲線の凹凸の変わり目) になる
 - 標準偏差が変化すると、分布の高さや広がりが変化する
- 平均値、中央値、最頻値は一致する
- 平均値と標準偏差から、分布の割合 (曲線とx軸に囲まれる面積) が決まる
 - $\mu \pm \sigma$ の範囲 : 全体の約 68.24%
 - $\mu \pm 2\sigma$ の範囲 : 全体の約 95.44%
 - $\mu \pm 2\sigma$ の範囲 : 全体の約 97.73%
 - それ以外の範囲 : 全体の約 0.27%

標準正規分布

標準正規分布とは

- 正規分布で、平均値が 0、標準偏差が 1 になるように、変数 $\mathcal{X}$ を次のように変換する (変数変換)

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

- すると、標準偏差の式は次のようになる

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

- 確率密度関数が上の式になるとき、「 $\mathcal{X}$ は、標準正規分布にしたがう」という
 - 「 $\mathcal{X}$ は、平均が 1 で標準偏差が 0 の正規分布にしたがう」ことになり、 $N(0, 1^2)$ と表すことができる

- つまり、変数だけから分布が決まる
- さまざまな推定や検定に使われる

標準化（基準化）

- 先ほどの変数変換を、「標準化」または「基準化」という

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

- (感覚としては)分布を平均値の分だけ0まで移動し、分散の広がりを $\frac{1}{\sigma}$ にする
 - 単位の異なるデータや平均値・分散が異なるデータを比較するときに使う(英語と数学のテストの成績の比較)
- ちなみに偏差値は、標準化を応用したもので、次のような式になる

$$z = 50 + 10 \times \frac{x - \mu}{\sigma}$$

標準正規分布の特徴

- 基本的な特徴は、正規分布と同じ
- 確率密度関数とx軸で囲まれた面積は1で、面積は確率(割合)を表す

カイ二乗分布

カイ二乗分布とは

- 変数 x_n が標準正規分布にしたがい、互いに独立であるとする
- 次のようになるとき、「 x は、自由度 r のカイ二乗 (χ^2) 分布にしたがう」という

$$\chi^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

- 自由度とは分布の形状に影響を及ぼす値で、自由度の値が変わると分布の形状も変化する

カイ二乗分布の特徴

- 平均は n 、分散は $2n$ になる
- 適合度や独立性の検定などに利用される
- 自由度が大きくなると、対称な分布に近づく

t分布

t分布とは

- 標準正規分布にしたがう確率変数 x と、自由度 r のカイ二乗分布 χ_r^2 にしたがう確率変数 y があり、互いに独立であるとする
- 次のようになるとき、「 x は、自由度 r のt分布にしたがう」という

$$t = \frac{x}{\sqrt{\frac{\chi_r^2}{r}}}$$

- (感覚としては)正規分布に従う統計量を標準化したものの分布を表す

t分布の特徴

- 平均は0、分散は $\frac{r}{r-2}$ になる
- 自由度が大きくなると、標準正規分布に近づく
- 母平均の推定や検定、平均値の差の検定や検定など、多くの統計的推定で利用される

F分布

F分布とは

- 確率変数 X と確率変数 Y が、それぞれ自由度 m と n のカイ二乗分布にしたがい、互いに独立であるとする
- 次のようになるとき、『 X は、第一自由度が m で第二自由度が n のF分布にしたがう』という

$$F = \frac{X_m^2}{m} \bigg/ \frac{X_n^2}{n}$$

- (感覚としては)分散の比に対応する分布を表す

F分布の特徴

- 分散検定や分散分析(分散比の分布を調べる)に利用される
- 平均は $\frac{n}{n-2}$ 、分散は $\frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$ になる