

点推定と区間推定

点推定

点推定とは

- 標本から母集団の特性値を推定する
 - 母数(パラメータ): 母集団の特性値(統計量)
 - 母平均(母集団の平均)、母分散(母集団の分散)、母比率(母集団の比率)
 - 直接調べることはできない
 - 推定量: 標本をもとに母数として推定した統計量
 - 標本平均(標本の平均)、不偏分散(標本の分散)、標本比率(標本の比率)
 - 推定値: 推定量から求めた具体的な値
- 点推定では、標本の推定値が必ずしも母数と一致するとは限らない(たいてい誤差が生じる)

推定量の望ましい性質

- 不偏性
 - その期待値(平均値)が母数と一致する推定量を「不偏推定量」という
 - 標本平均について、その期待値は母平均に一致する(中心極限定理へ)
- 一致性
 - 標本数を大きくしていくと推定値が母数に近づく推定量を「一致推定量」という
 - [大数の法則](#)から明らか(統計的確率は数学的確率に近づく)
- 有効性
 - ある母数に対して2つ以上の推定量がある場合に分散(誤差)の小さい推定量を「有効推定量」という
 - 標本の中央値に比べ、標本平均の方が、分布の分散が小さい

区間推定

区間推定とは

- 「ある」確からしさで、母集団の特性値の範囲を示す

信頼区間と信頼係数

- 信頼区間
 - 「ある」確からしさで示される、母集団の特性値の範囲
 - 95%信頼区間: 標本から平均値を出したとき、母平均(母集団の平均)がその区間にあるのが100回中95回以上の確率で、間違える危険性が5回未満
 - 99%信頼区間: 標本から平均値を出したとき、母平均(母集団の平均)がその区間にあるのが100回中99回以上の確率で、間違える危険性が1回未満
 - 注意: 「母平均の値が95(または99)%の確率でその区間のどこかにある」と解釈してはいけない
 - 信頼限界: 信頼区間の上限および下限の値
- 信頼係数
 - 区間推定の確実性をあらわし、「 $1-\alpha$ 」(α は0.05または0.01)であらわす
 - 信頼度: $100 \times (1-\alpha) \%$

中心極限定理

- 平均が μ 、分散が σ^2 の母集団から大きさ n の標本を抽出して、その標本平均 $\bar{x}$ を調べると、その分布は平均が μ 、分散が $\frac{\sigma^2}{n}$ の正規分布に従う (n は十分大きな数とする)
 - つまり、「標本平均の平均 (期待値) は、母集団の平均に一致する」
 - また、「母集団の分布に関係なく、標本平均の平均は正規分布にしたがう」
 - 母集団が正規分布にしたがうなら、標本の大きさにかかわらず、中心極限定理が成り立つ
 - 参考URL: <http://www.kwansei.ac.jp/hs/z90010/sugakuc/toukei/tyuusin2/chuusin.htm>