

○ 確率分布に関するExcelの関数 (1)

■ そのほかの関数 (1)

■ LN (1)

■ EXP (2)

■ 正規分布 (2)

■ NORMDIST (2)

■ NORMINV (3)

■ 標準正規分布 (3)

■ NORMSDIST (3)

■ NORMSINV (3)

■ t分布 (3)

■ TDIST (4)

■ TINV (4)

■ カイ2乗分布 (4)

■ CHIDIST (4)

■ CHIINV (5)

■ F分布 (5)

■ FDIST (5)

■ FINV (5)

確率分布に関するExcelの関数

推定・検定で利用できる、確率分布に関するExcelの関数を紹介します。

▲ ▼

そのほかの関数

▲ ▼

LN

• 自然対数 (

$$\log_e = \ln$$

) の値を計算するには、LN関数を利用します。

LN (自然対数の値を返す)

○ 書式 : LN(数値)

○ 引数 : 数値 ... : 自然対数を求める正の実数

○ 例：

$$\log_e 10 = \ln 10$$

の階乗を計算する

=LN(10)

▲ ▼

EXP

- 自然対数の底（ $e=2.712\dots$ ）のべき乗を計算するには、EXP関数を利用します。

EXP（自然対数の底のべき乗の値を返す）

- 書式：EXPT(数値)
- 引数：数値 ... ：べき乗の指数
- 例：

$$e^2$$

の階乗を計算する

=EXP(2)

▲ ▼

正規分布

▲ ▼

NORMDIST

NORMDIST（正規分布において任意のxに対する累積確率pを返す）

- 書式：NORMDIST(x, 平均, 標準偏差, 定数)
 - 引数：x ：横軸 x の値
 - 引数：平均 ：データの平均
 - 引数：標準偏差 ：データの標準偏差
 - 引数：定数 ：「TRUE」なら累積確率、「FALSE」なら確率分布関数の値を返す
- 例：平均が1、標準偏差が2の正規分布でxが0のときの累積確率を計算する

=NORMDIST(0, 1, 2, TRUE)

▲ ▼

NORMINV

NORMINV (正規分布において累積確率pに対するxの値を返す)

- 書式 : NORMINV(p, 平均, 標準偏差)
 - 引数 : p : 累積確率
 - 引数 : 平均 : データの平均
 - 引数 : 標準偏差 : データの標準偏差
- 例 : 平均が1、標準偏差が2の正規分布で累積確率が0.975 (97.5%) のときのxの値を計算する

```
=NORMINV(0.975, 1, 2)
```



標準正規分布



NORMSDIST

NORMSDIST (標準正規分布において任意のzに対する累積確率pを返す)

- 書式 : NORMSDIST(z)
 - 引数 : z : 横軸 z の値
- 例 : 標準正規分布でzが1.95のときの累積確率を計算する

```
=NORMSDIST(1.95)
```



NORMSINV

NORMSINV (標準正規分布において累積確率pに対するzの値を返す)

- 書式 : NORMSINV(p)
 - 引数 : p : 累積確率
- 例 : 累積確率が0.95 (95%) のときのzの値を計算する

```
=NORMSINV(0.95)
```



t分布



TDIST

TDIST (t分布において任意のt値に対する上側確率pを返す)

- 書式 : TDIST(t, f, 定数)
 - 引数 : t : 横軸 t の値
 - 引数 : f : 自由度
 - 引数 : 定数 : 「1」ならpの値、 「2」ならpの2倍の値を返す
- 例 : 自由度が4のt分布でtが4.6のときの上側確率を計算する

```
=TDIST(4.6, 4, 1)
```



TINV

TINV (t分布において両側確率pに対するt値を返す)

- 書式 : TINV(p, f)
 - 引数 : p : 両側確率 (上側確率を求める場合はpを2倍する)
 - 引数 : f : 自由度
- 例 : 自由度が4のt分布で両側確率が0.05 (5%) のときのtの値を計算する

```
=TINV(0.05, 4)
```



カイ2乗分布



CHIDIST

CHIDIST (カイ2乗分布において任意のカイ2乗値 xに対する上側確率pを返す)

- 書式 : CHIDIST(x, f)
 - 引数 : x : カイ2乗値 x の値
 - 引数 : f : 自由度
- 例 : 自由度が10のカイ2乗分布でカイ2乗値が18のときの上側確率を計算する

```
=CHIDIST(18, 10)
```



CHIINV

CHIINV (カイ2乗分布において上側確率pに対するカイ2乗値 x を返す)

- 書式 : CHIINV(p, f)
 - 引数 : p : 上側確率
 - 引数 : f : 自由度
- 例 : 自由度が10のカイ2乗分布で上側確率が0.05 (5%) のときのカイ2乗値の値を計算する

```
=CHIINV(0.05, 10)
```



F分布



FDIST

FDIST (F分布において任意の自由度とF値に対する上側確率pを返す)

- 書式 : FDIST(F, f1, f2)
 - 引数 : F : F値
 - 引数 : f1 : 第1自由度
 - 引数 : f2 : 第2自由度
- 例 : 第1自由度が3、第2自由度が4のF分布でF値が18のときのの上側確率を計算する

```
=FDIST(18, 3, 4)
```



FINV

FINV (F分布において任意の自由度と上側確率pに対するF値を返す)

- 書式 : CHIINV(p, f1, f2)
 - 引数 : p : 上側確率
 - 引数 : f1 : 第1自由度
 - 引数 : f2 : 第2自由度
- 例 : 第1自由度が3、第2自由度が4のF分布で上側確率が0.05 (5%) のときのカイ2乗値の値を計算する

```
=FINV(0.05, 3, 4)
```