

2010/9th/Expected_Value

2026年 6月 22日

目次

- [2010/9th/Expected_Value0](#)
 - [確率変数の期待値と分散0](#)
 - [期待値（平均値）0](#)
 - [期待値とは0](#)
 - [期待値の計算例（1）0](#)
 - [期待値の計算例（2）0](#)
 - [期待値の計算例（3）0](#)
 - [期待値と算術平均との関係0](#)
 - [分散と標準偏差0](#)
 - [確率変数の分散と標準偏差0](#)
 - [確率変数の分散と標準偏差の特徴0](#)
 - [確率変数の分散と標準偏差の計算0](#)

確率変数の期待値と分散

— —

期待値（平均値）

— —

期待値とは

- 確率変数 X の確率分布が次のようなとき、
 X x_1 x_2 \dots x_n 計
確率 p_1 p_2 \dots p_n 1
- 確率変数 X の平均値、または期待値は、次のように表せる
$$\mu = E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n$$
- 期待値とは、1回の試行の結果として期待される値の大きさを表す

— —

期待値の計算例（1）

- サイコロを1回投げたときにでた目の数を確率変数 X を使うと、その確率分布は次のようになる
 X 1 2 3 4 5 6 計
確率 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ 1
- 確率変数 X の期待値（平均値）は、 $n=6$ なので、

$$x_1 = 1, x_2 = 2, \dots, x_6 = 6$$

$$p_1 = \frac{1}{6}, p_2 = \frac{1}{6}, \dots, p_6 = \frac{1}{6}$$

- したがって、次のようになる

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + \dots + 6 \times \frac{1}{6} \\ &= \frac{21}{6} = 3.5 \end{aligned}$$

- つまり、サイコロを何回も投げたときに、でた目の平均をとると 3.5 になることを示している

期待値の計算例 (2)

- サイコロを5回連続で投げたときに1の目が出る回数を確率変数 X とすると、その確率分布は次のようになる

X	0	1	2	3	4	5
確率	0.4019	0.4019	0.1608	0.0322	0.0032	0.0001

- 確率変数 X の期待値 (平均値) は、 $n=6$ なので、

$$x_1 = 0, x_2 = 1, \dots, x_6 = 5$$

$$p_1 = 0.4019, p_2 = 0.4019, \dots, p_6 = 0.0001$$

- したがって、次のようになる

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times 0.4019 + 1 \times 0.4019 + 2 \times 0.1608 + 3 \times 0.0322 + 4 \times 0.0032 + 5 \times 0.0001 \\ &\simeq 0.83 \end{aligned}$$

- つまり、サイコロを5回連続投げて1の目が出るのは1回あるかないか程度であることを示している

期待値の計算例 (3)

- 宝くじの期待値を求めることもできる。宝くじの場合は「当せん金×当せん確率」の合計が期待値となる。
- 例えば、平成21年年末ジャンボ宝くじは、1ユニット (1000万枚) あたり、次のような当せん本数になっている。なお、当せん確率は「当せん本数÷1000万×100」から求めている。

等級	当せん金	当せん本数	当せん確率
1等	200,000,000円	1本	0.00001%
1等前後賞	50,000,000円	2本	0.00002%
1等組違い賞	100,000円	99本	0.00099%
2等	100,000,000円	2本	0.00002%
3等	5,000,000円	10本	0.0001%
4等	100,000円	600本	0.006%
5等	10,000円	10,000本	0.1%
6等	3,000円	100,000本	1%
7等	300円	1,000,000本	10%
元気に2010年賞	1,000,000円	100本	0.001%

- 宝くじがいくら当たるかの期待値を調べるには、「当せん金×当せん確率」の合計を求めるので、

$$E(X) = 200,000,000 \times 0.00001\% + 50,000,000 \times 0.00002\% + \dots + 300 \times 10\% + 1,000,000 \times 0.001\% \\ = 141.99$$

- つまり、宝くじ1枚 (300円) を買うと、1枚につき141.99円の還元が期待できる、ということを示している。

期待値と算術平均との関係

- n 個のデータ x_1, x_2, \dots, x_n の平均値は、次のように表せる

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \\ = x_1 \times \frac{1}{n} + x_2 \times \frac{1}{n} + \dots + x_n \times \frac{1}{n}$$

- ここで確率について、 $p_1 = \frac{1}{n}, p_2 = \frac{1}{n}, \dots, p_n = \frac{1}{n}$ とおく、つまり各々の確率が等しいと考えると、

$$\bar{x} = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n \\ = E(X)$$

- すなわち、各々の確率が等しくても等しくなくても、平均値 (期待値) を求めることができる

分散と標準偏差

確率変数の分散と標準偏差

- 確率変数 X の確率分布が次のようなとき、

X $x_1 x_2 \dots x_n$ 計

確率 $p_1 p_2 \dots p_n$ 1

- 確率変数 X の分散は次のように表す

$$\sigma^2 = V(X) = (x_1 - \mu)^2 p_1 + (x_2 - \mu)^2 p_2 + \dots + (x_n - \mu)^2 p_n \\ = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i$$

- μ は期待値 $E(X)$ 簡単に表したもの
- 分散の正の平方根を、確率変数 X の標準偏差といい、次のように表す

$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$

確率変数の分散と標準偏差の特徴

- 分散や標準偏差が小さいほど、確率変数の値は平均に集中し、ばらつきが小さい
- 分散や標準偏差が大きいほど、確率変数の値は平均から離れ、ばらつきが大きい
- 分散は変数の単位の2乗を表す (例えば変数の単位がcmなら、分散の単位cm²) ため、元の単位と同じ標準偏差を用いて平均からのばらつきを表す

確率変数の分散と標準偏差の計算

- サイコロを1回投げたときにでた目の数を確率変数 X を使うと、その確率分布は次のようになる

X	1	2	3	4	5	6	計
確率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

- したがって、分散は次のようにして求められる

$$\begin{aligned}\sigma^2 = V(X) &= (1-3.5)^2 \times \frac{1}{6} + (2-3.5)^2 \times \frac{1}{6} + \dots + (6-3.5)^2 \times \frac{1}{6} \\ &= \frac{35}{12} \simeq 2.92\end{aligned}$$

- また、標準偏差は次のようになる

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{V(X)} \\ &= \sqrt{\frac{35}{12}} \simeq 1.71\end{aligned}$$

- つまり、サイコロを何回も投げたとき、そのでた目の平均が 3.5 ± 1.71 (1.79 ~ 5.21) の範囲になる確率が高いことを示している