

# 健康統計学 第3回

今回は、代表値と散布度（テキスト15～32ページ）について学習します。

## テキスト

- 『やさしい保健統計学 改訂第4版』 縣 俊彦著 (南江堂)

## 今回の内容

1. [ギリシャ文字](#)
2. [代表値](#)
3. [散布度](#)
4. [補足: 歪度と尖度](#)
5. [Excelで代表値と散布度を計算](#)

## ギリシャ文字

統計学では、数式などでギリシャ文字がよく使われます。文字と読み方を覚えておきましょう。

大文字	小文字	読み方	使用される統計量
$A$	$\alpha$	アルファ	確率、第1種の過誤、有意水準
$B$	$\beta$	ベータ	第2種の過誤
$\Gamma$	$\gamma$	ガンマ	ガンマ関数
$\Delta$	$\delta$	デルタ	分散
$E$	$\epsilon$	イプシロン	
$Z$	$\zeta$	ゼータ	
$H$	$\eta$	イータ	
$\Theta$	$\theta$	シータ	定数、推定値など
$I$	$\iota$	イオタ	
$K$	$\kappa$	カッパ	
$\Lambda$	$\lambda$	ラムダ	定数など
$M$	$\mu$	ミュー	母平均
$N$	$\nu$	ニュー	
$\Xi$	$\xi$	グザイ	
$O$	$\phi$	オミクロン	
$\Pi$	$\pi$	パイ	円周率
$P$	$\rho$	ロー	相関係数
$\Sigma$	$\sigma$	シグマ	分散、標準偏差
$T$	$\tau$	タウ	
$\Upsilon$	$\upsilon$	ウプシロン	
$\Phi$	$\phi$	ファイ	空事象
$X$	$\chi$	カイ	$\chi^2$ (カイ二乗) 検定
$\Psi$	$\psi$	プザイ	
$\Omega$	$\omega$	オメガ	全事象

# 代表値 ( average )

- データの分布などの特徴を示す数値 (特性値) を「代表値」という。
- データ全体をひとつの値で代表させる値である。

## 平均値 ( mean )

### 算術平均 ( arithmetic mean )

- 算術平均  $\bar{x}$  は、データをすべて足しあわせ、データ数で割ったもの。
- 平均値のなかで、もっとも一般的なもの。

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\end{aligned}$$

### 幾何平均 ( geometric mean )

- 幾何平均  $Gm$  は、各データの値の積に対してデータ数のべき根を求めたもの。

$$\begin{aligned}Gm &= \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n} \\ &= (x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n)^{1/n} \\ &= \left( \prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n}\end{aligned}$$

- 幾何平均の例
  - 5年間の物価上昇率が7%のとき、1年の平均上昇率は何%か？
  - 過去3年間の売上高の対前年比が120%、110%、130%のとき、平均の売上高の伸びは？

### 調和平均 ( harmonic mean )

- 調和平均  $Hm$  は、データ数を各データの値の逆数の和で割ったもの。

$$\begin{aligned}Hm &= \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} \\ &= \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}\end{aligned}$$

- 調和平均の例
  - 山頂まで6kmの道のりを、往きは2km/hで、帰りは6km/hで歩いたとき、平均の速さはいくらか？
  - 車でドライブをして、最初の24kmは30km/h、次の24kmは40km/h、最後の24kmは60km/hで走った時、平均速度はいくらか？

## 中央値 ( median )

### 中央値 ( 中位数 )

- 中央値  $Me$  は、データを大きさの順に並べたときに、中央にくる値のことである。
  - データ数が奇数のときは中央にくるデータの値になる。
  - データ数が偶数のときは中央にある2つのデータの平均の値になる。

$$Me = \begin{cases} x_m & \text{if } n \text{ odd, } m = (n+1)/2 \\ \frac{x_m + x_{m+1}}{2} & \text{if } n \text{ even, } m = n/2 \end{cases}$$

- 中央に位置するデータが複数個ある場合(「結び(tie)」があるという)、次のような式で中央値を求めることができる。

$$Me = \frac{1}{2n_M} (n_{x>M} - n_{x<M}) + M$$

- 中央にあるデータ:  $M$
  - 値  $M$  になるデータの個数:  $n_M$
  - 値  $M$  より小さいデータの個数:  $n_{x<M}$
  - 値  $M$  より大きいデータの個数:  $n_{x>M}$
- 度数分布表がある場合は、階級や度数などの情報から、中央値を求めることもできる。

$$Me = l_m + \left(\frac{n}{2} - F\right) \frac{h}{f_m}$$

- 標本数:  $n$
- 階級幅:  $h$
- $m$  番目の階級の下限:  $l_m$
- $m$  番目の階級の度数:  $f_m$
- $m-1$  番目までの累積度数:  $F$

#### 四分位数 (quartile)

---

- ヒストグラムから考えると、四分位数はヒストグラムの面積を1/4ずつに分ける値である。
  - 中央値は、ヒストグラムの面積を半分に分ける値になる。
- データを大きさの順に並べた場合は、データの個数を4分の1ずつの部分にわけると個所である。
- 小さいほうから、第1、第2、第3四分位数といい、中央値は、第2四分位数になる。
- データが  $n$  個のあるときの第1四分位数  $Q_1$  と第3四分位数  $Q_3$  は、次のようにして求められる。
  - $n = 4k + 1, 2, 3$  の場合

$$\begin{aligned} Q_1 &= x_{k+1} \\ Q_3 &= x_{n-k} \end{aligned}$$

- $n = 4k$  の場合

$$\begin{aligned} Q_1 &= (x_k + x_{k+1})/2 \\ Q_3 &= (x_{n-k} + x_{n-k+1})/2 \end{aligned}$$

#### 百分位数 (percentile)

---

- 百分位数(パーセンタイル値)は、ヒストグラムの面積を1/100ずつに分ける値である。
  - 25パーセンタイル値は第1四分位数である。
  - 50パーセンタイル値は中央値(第2四分位数でもある)。
- 度数分布表がある場合は、階級や度数などからパーセンタイル値  $P$  を求めることもできる。

$$P = l_m + \left(\frac{n \times p}{100} - F\right) \frac{h}{f_m}$$

- 標本数:  $n$

- 階級幅 :  $h$
- $m$  番目の階級の下限 :  $l_m$
- $m$  番目の階級の度数 :  $f_m$
- $m-1$  番目までの累積度数 :  $F$

## 最頻値 ( mode )

- 最頻値  $M_o$  は、データのなかで**最も多く出てくる値**のことである。
  - 度数分布表がある場合は、もっとも度数の多い階級値を最頻値として、次の式から最頻値を求めることができる。

$$M_o = l_m + \frac{f_{m+1}}{f_{m-1} + f_{m+1}} \times h$$

- 最大度数の階級 :  $m$
  - 階級幅 :  $h$
  - $m$  番目の階級の下限 :  $l_m$
  - $m$  番目の階級の度数 :  $f_m$
- 分布が釣り鐘形の場合は、ピアソン (Pearson) の式を用いることができる。

$$M_o = \bar{x} - 3 \times (\bar{x} - Me)$$

## 代表値の特性

- 平均値はすべてのデータを反映している。
  - ハズレ値 ( 極端に小さく・大きくて飛び離れたデータ ) があるとその影響を受けやすいため、ハズレ値の考慮が必要。
- 中央値 ( 四分位数や百分位数も ) は分布上の位置 ( 中央など ) を示す。
  - ハズレ値の影響を受けにくく、分布に偏りがある場合に優れている。
- 最頻値は、「データの多くはこのあたりにある」という説明をするのにわかりやすい。
  - ハズレ値の影響を受けにくい。

# 散布度 ( dispersion )

- 代表値のほかに、重要な特性値として「**散布度**」がある。
- 平均値に対して、**どれくらいデータが散らばっているか**を示す。
  - 分布の裾の広がり具合
  - 平均値への集中の度合い

## 標準偏差

### 偏差 ( deviation )

- 偏差  $D$  は、各データと平均との差である。
  - + の偏差と - の偏差があるため、すべての偏差の合計は0になる。

$$D_i = \bar{x} - x_i$$

### 分散(variance)と標準偏差(standard deviation)

分析対象となる全体 ( 母集団 ) の分布のバラツキの度合いを求める場合には、代表的な散布度である、分散と標準偏差を用いる。

- 分散  $s^2$  (または  $\sigma^2$ ) は、**偏差平方和**(偏差の二乗の和)をとって、その平均を求めたものである。
  - 全データの平均からのバラツキの程度を示す。

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i^2 \end{aligned}$$

- 標準偏差  $s$  は、分散の平方根を求めたものである。
  - 全データの平均からのバラツキの程度を示す (単位はデータと同じ)。

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n}}$$

- 標準偏差や分散の値が大きい場合はデータのバラツキが大きく、小さい場合はバラツキが小さい (データが同じ程度に揃ってる)

## 不偏分散 ( unbiased variance ) と不偏標準偏差 ( unbiased standard deviation )

分析対象となる全体 ( 母集団 ) ではなく、対象の一部 ( 標本 ) の分布のバラツきの度合いを求める場合には、不偏分散と不偏標準偏差を用いる。

- 不偏分散  $U^2$  は、偏差平方和 ( 偏差の二乗の和 ) をとって、その平均を求めたものである。
  - 分散との違いは、分母は「標本数-1」であること。
  - データ全体についての平均値からのバラツきの程度を示す。

$$U^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2$$

- 不偏標準偏差  $U$  は、分散の平方根を求めたもの
  - 全データの平均からのバラツきの程度を示す ( 単位はデータと同じ ) 。

$$U = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n-1}}$$

## 標準偏差の和

$n$  組の資料 ( データ ) があるとき、資料全体の標準偏差は次のようになる。

$$s_T = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n N_i (V_i + D_i^2)}{\sum_{i=1}^n N_i}}$$

- $s_T$  ... 全体の標準偏差
- $N_i$  ... 組目の資料の標本数
- $V_i$  ... 組目の資料の分散
- $D_i$  ... 組目の資料の偏差

## 範囲 ( range )

- 範囲  $R$  は、データの最大値  $x_{max}$  と最小値  $x_{min}$  との差で、データ全体の範囲を示す。
- ハズレ値の影響を受けやすい

$$R = x_{max} - x_{min}$$

## 四分位偏差 ( quartile deviation )

- 四分位偏差はデータの変動の目安に利用される散布度で、代表値として中央値を用いたときに使われることがある。
- ハズレ値やデータ数に影響されにくい値である。

四分位偏差 = ( 第3四分位数 - 第1四分位数 ) / 2

## 平均偏差 ( mean deviation )

- 平均偏差  $M_{dev}$  は、偏差の絶対値を平均したもので、データと平均値とのずれの程度を示す。

$$\begin{aligned}M_{dev} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |D_i|\end{aligned}$$

## 変異係数 ( coefficient of variance )

- 変異係数(変動係数)  $Cv$  は、標準偏差を平均で割ったもので、平均値に対する標準偏差の割合を示す(%表示)。
- 変異係数は相対的な散布度(割合を示す無名数で単位はない)で、平均値や標準偏差の異なる複数の種類のデータを比較するときに用いる。

$$Cv = s/\bar{x}$$

- 2つの系列(データの集まり)を比較するとき、次のような場合は相対的散布度が有利になる。
  - 双方の単位が同じで、平均がほぼ等しい
  - 双方の単位は同じだが、平均が違う
  - 双方の単位が違う



# 歪度と尖度

教科書には載っていませんが、散布度に関連する、分布の特徴を表すための重要な指標について説明します。

## 歪度 (skewness)

- 歪度(わいど)は、分布の左右対称性の違いを表す。

$$Sk = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3 / s^3$$

- データの個数:  $n$
  - データ全体の平均値:  $\bar{x}$
  - データ全体の標準偏差:  $s$
- 歪度  $Sk$  の値によって分布の左右対称性がわかる。
    - $Sk = 0$  の場合、データは左右対称に分布
    - $Sk > 0$  の場合、左に偏った分布
    - $Sk < 0$  の場合、右に偏った分布
    - ただし、 $Sk = 0$  だからといって、常に分布の形が左右対称とは限らない

## 尖度 (kurtosis)

- 尖度(せんど)は、分布の形が先がとがっているか偏平かを表す。

$$Ku = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4 / s^4$$

- データの個数:  $n$
  - データ全体の平均値:  $\bar{x}$
  - データ全体の標準偏差:  $s$
- 尖度  $Ku$  の値によって分布の尖り具合がわかる。
    - $Ku$  が大きいほど、尖った形の分布
    - $Ku$  が小さいほど、偏平な形の分布

# Excelで代表値と散布度を計算

## 数式の入力

Excelでは、セルに「数式」を入力することで、計算ができます。数式を入力するときの基本的なルールは、次のとおりです。

- 最初は「=」ではじめる
- カッコ「()」を使って計算する順番を指定できる
- 四則演算が使える（半角で入力）

演算	数学での記号	Excelでの記号	計算式の例	表示される結果
足し算	+	+	=1+2	3
引き算	-	-	=2-3	-1
掛け算	×	*	=4*5	20
割り算	÷	/	=1/2	0.5
べき乗	^	^	=2^3	8

### 数式の入力例

たとえば、身長と体重のデータから人の肥満度をはかる指標である、BMI（ボディマス指数）を計算する場合を考えてみましょう。

BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m) の2乗

身長がB2～B11セルに、体重のデータがC2～C11セルに入力されており、それらから求めたBMIをD2～D11セルに表示させるには、次のように操作します。

1. D2セルに次の計算式を入力する

=C2/((B2/100)^2) （「/100」としているのは、身長がcm単位のため）

2. 「Enter」キーを押すと、計算結果が表示される
3. D2セルの計算結果を、D3～D11セルへコピーする

### 平方根、n乗根の計算

- 正の平方根( )を計算するには、SQRT関数を利用します。

#### SQRT(平方根を計算する)

- 書式：SQRT(数値)
- 引数：平方根を求める数値
- 例：A12セルの数値の平方根を計算する

=SQRT(A12)

- n乗根を計算する関数はないため、べき乗(^)を利用する
  - 「n乗根の計算」は、「1/nのべき乗の計算」と同じ意味になることを利用する

◦ 例：A12セルの数値の4乗根  $\sqrt[4]{A12}$  を計算

```
=A12^(1/4)
```

## 代表値を計算

### 平均値

- 算術平均は、**AVERAGE**関数を利用します。

#### **AVERAGE (平均値を計算する)**

- 書式 : AVERAGE(数値1, 数値2, ...)
- 引数 : 数値1, 数値2, ... : 平均を計算するセルの範囲
- 例 : F1 ~ F10セルまでのセルの数値の平均値を計算する

```
=AVERAGE(F1:F10)
```

- 幾何平均は、**GEOMEAN**関数を利用します。

#### **GEOMEAN (正の数からなる配列またはセル範囲のデータの幾何平均を計算する)**

- 書式 : GEOMEAN(数値1, 数値2, ...)
- 引数 : 数値1, 数値2, ... : 平均を計算するセルの範囲

- 調和平均は、**HARMEAN**関数を利用します。

#### **HARMEAN (1 組の数値の調和平均を計算する)**

- 書式 : HARMEAN(数値1, 数値2, ...)
- 引数 : 数値1, 数値2, ... : 平均を計算するセルの範囲

### 中央値

- 中央値は、**MEDIAN**関数を利用します。

#### **MEDIAN (引数に含まれる数値の中央値を求める)**

- 書式 : MEDIAN(数値1, 数値2, ...)
- 引数 : 数値1, 数値2, ... : 中央値を計算するセルの範囲
- 例 : F1 ~ F10セルまでのセルの中央値を求める

```
=MEDIAN(F1:F10)
```

### 四分位数

- 四分位数は、**QUARTILE**関数を利用します。

#### **QUARTILE (配列に含まれるデータから四分位数を抽出する)**

- 書式 : QUARTILEE(配列, 戻り値)
- 引数 : 配列 : 対象となるデータを含む配列 (セルの範囲)
- 引数 : 戻り値 : 戻り値として返す四分位数の内容を指定
  - 戻り値: 0: 最小値
  - 戻り値: 1: 第1四分位数 (25%)
  - 戻り値: 2: 第2四分位数 (50%)=中央値
  - 戻り値: 3: 第3四分位数 (75%)

- 戻り値: 4: 最大値

## 百分位数

- 百分位数は、PERCENTILE関数を利用します。

### PERCENTILE (配列に含まれるデータから百分位数 (%) を抽出する)

- 書式 : QUARTILEE(配列, 率)
- 引数 : 配列 : 対象となるデータを含む配列 (セルの範囲)
- 引数 : 率 : 0 ~ 1の値で、目的の百分位の値 (パーセンタイル値) を指定

## 最頻値

- 最頻値は、MODE関数を利用します。

### MODE (引数に含まれるデータのなかで最も頻繁に出現する値を求める)

- 書式 : MODE(数値1, 数値2, ...)
- 引数 : 数値1, 数値2, ... : 最頻値を計算するセルの範囲
- 例 : F1 ~ F10セルまでのセルの最頻値を求める

```
=MODE(F1:F10)
```

## 散布度を計算

### 分散

- 分散は、VARP関数を利用します。

### VARP (引数を母集団全体と見なし、母集団の分散 (標本分散) を求める)

- 書式 : VARP(数値1, 数値2, ...)
- 引数 : 数値1, 数値2, ... : 母集団に対応するセルの値、セルの範囲

### 標準偏差

- 標準偏差は、STDEVP関数を利用します。

### STDEVP (引数を母集団全体であると見なして、母集団の標準偏差を求める)

- 書式 : STDEVP(数値1, 数値2, ...)
- 引数 : 数値1, 数値2, ... : 母集団に対応するセルの値、セルの範囲

### 不偏分散

- 不偏分散は、VAR関数を利用します。

### VAR (引数を正規母集団の標本と見なし、標本に基づいて母集団の分散の推定値 (不偏分散) を求める)

- 書式 : VAR(数値1, 数値2, ...)
- 引数 : 数値1, 数値2, ... : 母集団の標本に対応するセルの値、セルの範囲

### 不偏標準偏差

- 不偏標準偏差は、STDEV関数を利用します。

### STDEV (引数を標本と見なし、標本に基づいて母集団の標準偏差の推定値を求める)

- 書式 : STDEV(数値1, 数値2, ...)

○引数：数値1, 数値2, ... :母集団に対応するセルの値、セルの範囲